

· 创疡临床 ·

MEBO 治疗放射性鼻腔粘膜
糜烂 17 例的临床观察

漆兴芝, 卢谷萍

【摘要】 目的: 探讨湿润烧伤膏(MEBO)对放射性鼻腔粘膜糜烂、溃疡的治疗效果。方法: 17 例患者创面均用 MEBO 全程治疗。结果: 17 例创面均在 MEBO 的治疗下自行愈合。结论: MEBO 可促进放射性鼻腔粘膜糜烂创面愈合。

【关键词】 MEBO; 放射性鼻腔粘膜糜烂; 治疗

【中图分类号】 R632.1; R765.2 **【文献标识码】** B **【文章编号】** 1001-0726(2002)04-0253-01

Clinical Observation on 17 Cases of Radiation Mucous Membrane Erosion of Nasal Cavity Qi Xing-zhi, Lu Gu-ping People's Hospital, Yichuan City, Jiangxi Province 336000, China

【Abstract】 Objective: To evaluate the efficacy of MEBO in treating radiation mucous membrane erosion in nasal cavity. Method: 17 cases of this disease were treated with MEBO. Results: All the wounds healed after MEBO treatment. Conclusion: MEBO is capable of promoting the healing of wounds of radiation mucous membrane erosion in nasal cavity.

【Key words】 MEBO; Radiation mucous membrane erosion in nasal cavity; Treatment

【CLC number】 R632.1; R765.2 **【Document code】** B **【ArticleID】** 1001-0726(2002)04-0253-01

放射性鼻腔粘膜溃疡、糜烂是鼻咽癌患者在放疗过程中的常见放疗反应, 它可直接影响放疗的正常实施及患者的生活质量。以往我们采用传统治疗方法治疗, 效果不甚满意。自 2000 年以来, 采用 MEBO 局部用药, 对 17 例放射性鼻腔粘膜糜烂患者进行临床治疗, 经过长期观察, 认为该疗法疗效显著, 创面愈合良好, 无副作用。现报告如下:

一、临床资料

本组 17 例, 男 15 例, 女 2 例, 均系鼻咽癌放疗后所致鼻腔粘膜干燥、出血、糜烂, 甚至溃疡。年龄在 41 岁~67 岁之间, 平均年龄 52 岁。

二、治疗方法

彻底清除鼻腔内分泌物, 用生理盐水棉球清洗干净。如粘膜出血较严重, 先用棉球压迫止血。用消毒棉签将 MEBO 直接涂于鼻腔糜烂、溃疡处, 以 1.5mm~2mm 厚为宜。每次用药前均需消毒棉签擦净前次药物, 每日用药 3~4 次。

三、结果

全组患者愈合时间最短为 10 天, 最长为 28 天, 17 例患者均在 MEBO 的全程治疗下自行愈合, 取得了满意的疗效。

四、讨论

放射性鼻腔粘膜糜烂是放疗过程中必然产生的

一种放疗反应, 而且与放射线的质量、治疗时间长短及剂量成正比。减少粘膜炎症的最好方法是停止放疗, 但这样不能达到消灭肿瘤的目的。为了使患者能顺利完成放疗, 必须积极有效地治疗其粘膜糜烂。以往我们曾使用过各种疗法, 均不满意。MEBO 是徐荣祥教授研制的一种良好的烧伤创面外用药物, 据我们的临床观察, 它对放射性鼻腔粘膜糜烂的疗效优于其它方法。主要原因有以下几点:

1. MEBO 的 β -谷甾醇具有抗炎, 抑制细菌生长、繁殖等作用, 可使创面细菌变异, 降低其毒性, 有效的控制和预防鼻腔内感染。

2. MEBO 可通过液化方式产生通畅引流作用, 能及时将创面基底的分泌物、渗出物引流排出, 湿润鼻腔内环境, 对局部组织提供充足的氧及营养物质, 有利于上皮再生, 促进创面愈合。

3. MEBO 为油性制剂, 其中含有较多的活血化淤成份, 可通过改善微循环, 达到止痛作用。

【作者简介】

漆兴芝 (1961—), 男 (汉族), 宜春人, 宜春医学院毕业, 主治医师。

卢谷萍 (1964—), 女 (汉族), 宜春人, 江西电大护理班毕业, 主管护师。

(收稿日期: 2002-04-02; 修回日期: 2002-05-22)