

3. MEBO 为框架软膏剂型, 具有油性湿润的特性, 留置时间长, 药效可长期发挥作用, 保持创面的湿润, 有利于引流, 并可防止瘢痕形成及发生粘连。

总之, 用 MEBO 涂治老年性阴道炎及溃疡, 有充分的科学理论根据。应用 MEBO 后, 临床治疗效果良好, 操作简单方便, 经济有效, 值得临床推广应用。

参考文献

- [1] 曲云英, 谢昌华, 鞠胜之, 等. MEBO 抗菌作用实验研究 [J]. 中国烧伤创疡杂志, 1998, 10 (4): 15.
- [2] 徐荣祥. 烧伤医疗技术蓝皮书 [M]. 中国医药科技出版社, 北京: 2000, 41-42.

- [3] 徐荣祥. MEBO 的作用原理 [J]. 中国烧伤创疡杂志. 1997, 9 (3): 24.
- [4] 罗成群. 烧伤烫伤皮肤再生修复已成为现实 [J]. 中国烧伤创疡杂志. 2001, 13 (2): 127.
- [5] 郎庆雪, 姜桂玲, 李健美. 湿润烧伤膏治疗外阴癌根治术后刀口裂开 12 例疗效观察 [J]. 中国烧伤创疡杂志. 2003, 15 (3): 221-222.

【作者简介】

扈春英 (1968—), 女 (汉族), 山东利津人, 山东医科大毕业, 妇产科医师。

杨文东 (1963—), 男 (汉族), 山东茌平人, 青岛大学医学院毕业, 主治医师。

石红梅 (1978—), 女 (汉族), 山东利津人, 滨州医学院毕业, 妇产科医师。

(收稿日期: 2003-11-07; 修回日期: 2004-01-05)

湿润烧伤膏纱条填塞治疗膀胱腹壁尿瘘

郑国衡, 王运生

【摘要】 目的: 观察美宝湿润烧伤膏 (MEBO) 纱条对膀胱腹壁尿瘘的临床疗效。方法: 直接将 MEBO 纱条填塞于腹壁窦道内, 每日换药 1~2 次。结果: 8 例膀胱腹壁尿瘘全部治愈, 愈合时间 7 天~12 天。结论: MEBO 纱条填塞引流治疗膀胱腹壁尿瘘效果显著。

【关键词】 膀胱腹壁尿瘘; 湿润烧伤膏; 纱条填塞; 治疗效果

【中图分类号】R694 【文献标识码】B 【文章编号】1001-0726 (2004) 01-0057-02

Vesicoabdominal wall urinary fistula cured by packing with MEBO gauze ZHENG Guo-heng, WANG Yun-sheng, Hospital of Chinese Medicine, Laiyang City, Hunan Province 421800, China

【Abstract】 Objective: To observe the efficacy of MEBO gauze in treating vesicoabdominal wall urinary fistula. Method: MEBO gauze was packed in the sinus of abdominal wall. The dressing was changed 1~2 times every day. Result: 8 cases of vesicoabdominal wall urinary fistula were all cured. The wound healing time was 7~12 days. Conclusion: MEBO gauze packing method is very efficacious in treating vesicoabdominal wall urinary fistula.

【Key words】 Vesicoabdominal wall urinary fistula; MEBO gauze packing; efficacy

在多数情况下,行暂时性耻骨上膀胱造瘘,患者的膀胱造瘘管需维持一段时间,一旦尿道排尿通畅,便可拔除。随之造瘘口自行闭锁、愈合,无需特殊治疗。但个别患者,特别是老年患者,由于膀胱及腹壁肌肉收缩力下降,窦道常不能及时闭合,尿液经窦口流出,可引起周围组织腐烂或感染、坏死。以往我们用盐水纱条或凡士林纱条填塞引流方法治疗,一般需时 2 周~3 周愈合或需更长时间。自 2000 年 7 月至 2003 年 7 月,我们对 8 例不能自愈的膀胱腹壁尿瘘患者改用湿润烧伤膏(MEBO)纱条填塞引流治疗,疗效显著。

一、临床资料

本组 8 例患者均为男性,年龄最大 76 岁,最小 57 岁,平均 66.5 岁,且有不同程度的前列腺增生症。他们都因不同疾病而实行耻骨上膀胱造瘘术,同时行保留导尿管。按一般规律,常规拔除导尿管后,若自行排尿通畅,可据情拔除膀胱造瘘管;如窦道不能及时闭合,尿液经膀胱腹壁窦道流出,对周围组织产生很大的刺激腐蚀作用,并引起瘘口周围组织皮肤糜烂,或继发不同程度的感染。

二、治疗方法与结果

将经过高压灭菌后的纱条均匀涂上 MEBO 烧伤膏,药膏用量在纱条上稍用力挤压便有油膏溢出为宜。用络合碘消毒腹部皮肤,窦道内用 3% 过氧化氢溶液和生理盐水擦洗,干棉球沾干后将 MEBO 纱条填塞于窦道内,松紧适宜,便于引流。所填入的纱条应将一头留于腔外,避免纱条落入膀胱内。根据引流情况,每日换药 1~2 次,直至痊愈。

8 例患者全部治愈,愈合时间为 7 天~12 天。临床观察发现,用药后 4~5 天,尿瘘基本停止,分泌物明显减少,窦道内出现新鲜肉芽组织,7~12 天后,窦道闭合。与我们以往用外科常规换药疗法需 2 周~3 周愈合的疗效相比,疗程明显缩

短。

三、讨论

治疗膀胱腹壁尿瘘的常规治疗方法是置入凡士林纱条或盐水纱条填塞引流,使窦道逐渐缩小,最终尿瘘停止,窦道闭合。但因尿液的化学刺激和腐蚀作用,很易发生周围组织糜烂、感染及坏死,使愈合时间延长,病人痛苦亦大。而 MEBO 是在传统中医药理论基础之上研制成的一种框架软膏剂型外用,具有清热解毒、活血化瘀、祛腐生肌等功能^[1]。用 MEBO 纱条填塞治疗膀胱腹壁尿瘘的机制为:①MEBO 可对已坏死的组织发生酸败,皂化、酶解和水解反应,使坏死组织失去亲脂力,借助湿化热力而冲出溃疡表层,以清除尿瘘壁的坏死组织^[2];②MEBO 含有氨基酸、脂肪酸、糖类等营养物质,可直接为瘘管的修复提供营养所需物质,促进组织愈合^[1]加速组织的自身修复,缩短创面愈合时间;③MEBO 中的 β -谷甾醇、黄芩甙、小檗碱成分具有抗炎、抗氧化、抑菌、增强免疫力,改善微循环等作用,给伤口组织提供了一个良好的生长修复环境^[1],并能有效地控制感染,促进愈合。

参考文献

- [1] 徐荣祥. 烧伤医疗技术蓝皮书 [M]. 北京: 中国医药科技出版社, 2000. 41.
- [2] 涂万模. MEBO 用于烧伤创面的疗效观察 [J]. 中国烧伤创疡杂志, 1990, 4: 18.

【作者简介】

郑国衡 (1961—), 男 (汉族), 湖南耒阳人, 衡阳医学院毕业, 主治医师。

王运生 (1973—) 男 (汉族), 湖南衡阳人, 湖南中医学院毕业, 住院医师。

(收稿日期: 2003-10-29; 修回日期: 2004-01-12)